

化学療法レジメン

レジメン名 DTX(60mg/m²)/トラスツズマブ(初回8mg/kg)

レジメンの概要 乳癌 (3週1回施用) 導入時用

診療科名 乳腺

投与量設定 トセタキセル 60mg/m²(day1),トラスツズマブ 8mg/kg(day1)

管理コード 150060

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間 | 用法・その他 | 癌 | 薬品名称 | 用量/単位 | Day 1 | | | | | | | | |
|----|---------|------------|-------------------------------------------------|---|------------------|---------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 点滴静注 | 時間: _____ | ルートkeep用 フラッシュ用 | | 大塚生食注(100mL瓶) | 1瓶 | ○ | | | | | | | | |
| 2 | 点滴静注 | 時間: 15分 | | | デキサート注射液6.6mg | 1瓶 | ○ | | | | | | | | |
| | | | | | 生理食塩液PL「フソー」50mL | 1瓶 | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 | 時間: 1時間 | | ● | トセタキセル注 | 60mg/m ² | ○ | | | | | | | | |
| | | | | | 大塚生食注(250mL袋) | 1袋 | | | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 | 時間: 1時間30分 | 注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈 | ● | トラスツズマブBS注 | 8mg/kg | ○ | | | | | | | | |
| | | | | | 注射用水(100mL) | 1瓶 | | | | | | | | | |
| | | | | | 大塚生食注(250mL袋) | 1袋 | | | | | | | | | |