

# 化学療法レジメン

レジメン名 ラムシルマブ/FOLFIRI

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

診療科名 消化器

投与量設定

サイラムザブ(ラムシルマブ) 8mg/kg(day1),イリリファン 150mg/m<sup>2</sup>(day1),レボレチルト 200mg/m<sup>2</sup>(day1),フルオウラシル 400mg/m<sup>2</sup>(bolus)(day1),2400mg/m<sup>2</sup>(46hr)(day1-2)

管理コード 100017

インターバル日数 14 (Day1から休業期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	CVポート メイン	時間: _____	埋込式ルート 穿針時用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート メイン	時間: 15分			デキサト注射液6.6mg ホラム注5mg パロヒト点滴静注パック0.75mg 50mL	1瓶 2管 1袋	○									
3	CVポート メイン	時間: 30分	全量250mLに調製 フィルターライン使用 初回は1時間	●	サイラムザ注 大塚生食注(250mL袋)	8mg/kg 1袋	○									
4	CVポート 側管	時間: 2時間	イリリファンと同時投与		レボレチルト注 大塚糖液5%(250mLソフトパック)	200mg/m <sup>2</sup> 1袋	○									
5	CVポート メイン	時間: 2時間	レボレチルトと同時投与	●	イリリファン注 大塚糖液5%(250mLソフトパック)	150mg/m <sup>2</sup> 1袋	○									
6	CVポート メイン	時間: 10分	全開で	●	フルオウラシル注 生理食塩液PL「フー」 50mL	400mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○									
7	CVポート メイン	時間: 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル注 生理食塩液(希釈用)	2400mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○									