

# 化学療法レジメン

レジメン名 FOLFIRI

レジメンの概要 胃癌、大腸癌

診療科名 消化器

投与量設定 レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup>(day1),イリノテカン 150mg/m<sup>2</sup>(day1),5-FU 400mg/m<sup>2</sup>(bolus)(day1),2400mg/m<sup>2</sup>(46hr)(day1-2)

管理コード 100010

インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	CVポート メイン	時間: _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート メイン	時間: <u>15分</u>			デキサート注射液6.6mg パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1袋	○									
3	CVポート 側管	時間: <u>2時間</u>	イリノテカンと同時投与		レボホリナート注 大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	200mg/m <sup>2</sup> 1袋	○									
4	CVポート メイン	時間: <u>2時間</u>	レボホリナートと同時投与	●	イリノテカン注 大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	150mg/m <sup>2</sup> 1袋	○									
5	CVポート メイン	時間: <u>10分</u>	全開で	●	5-FU注 生理食塩液PL「フソー」50mL	400mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○									
6	CVポート メイン	時間: <u>46時間</u>	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	5-FU注 生理食塩液(希釈用)	2400mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○									