

# 化学療法レジメン

レジメン名 FOLFIRI

レジメンの概要 胃癌、大腸癌

診療科名 消化器

投与量設定 レボレチート 200mg/m<sup>2</sup>(day1),イリリカチン 150mg/m<sup>2</sup>(day1),フルオウラシル 400mg/m<sup>2</sup>(bolus)(day1),2400mg/m<sup>2</sup>(46hr)(day1-2)

管理コード 100010

インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	CVポート メイン	時間: _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	CVポート メイン	時間: 15分			デキサト注射液6.6mg パロチロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1瓶 1袋	○								
3	CVポート 側管	時間: 2時間	イリリカチンと同時投与		レボレチート注 大塚糖液5%(250mLソフトパック)	200mg/m <sup>2</sup> 1袋	○								
4	CVポート メイン	時間: 2時間	レボレチートと同時投与	●	イリリカチン注 大塚糖液5%(250mLソフトパック)	150mg/m <sup>2</sup> 1袋	○								
5	CVポート メイン	時間: 10分	全開で	●	フルオウラシル注 生理食塩液PL「フー」 50mL	400mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○								
6	CVポート メイン	時間: 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル注 生理食塩液 (希釈用)	2400mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○								