化学療法レジメン

レジメン名　ベバシズマブ/FOLFOXIRI

レジメンの概要　治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

診療科名　消化器

投与量設定　ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ 5mg/kg(day1),ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ 85mg/㎡(day1),ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ 200mg/㎡(day1),ｲﾘﾉﾃｶﾝ 150mg/㎡(day1),2400mg/㎡(46hr)(day1-2)

管理コード　100019

インターバル日数　14　(Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	CVポート メイン	時間:	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	CVポート メイン	時間: 30分	全量100mLに調製 ※初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS注	5 mg/kg	○								
					生理食塩液(希釈用)	1瓶									
3	CVポート メイン	時間: 30分			ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg	1.5瓶	○								
					アロカリス点滴静注235mg	1瓶									
					ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL	1袋									
4	CVポート メイン	時間: 2時間	全量250mLに調製	●	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注	85mg/㎡	○								
					ﾌﾞﾄﾞｳ糖液5%(希釈用)	1袋									
5	CVポート 側管	時間: 2時間	ｲﾘﾉﾃｶﾝと同時投与		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ注	200mg/㎡	○								
					大塚糖液5%(250mLｿﾌﾄﾊﾞｯｸ)	1袋									
6	CVポート メイン	時間: 2時間	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時投与	●	ｲﾘﾉﾃｶﾝ注	150mg/㎡	○								
					大塚糖液5%(250mLｿﾌﾄﾊﾞｯｸ)	1袋									
7	CVポート メイン	時間: 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	5-FU注	2400mg/㎡	○								
					生理食塩液(希釈用)	1瓶									