

化学療法レジメン

レジメン名 **ベバシズマブ/FOLFOXIRI**

レジメンの概要 **治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌**

診療科名 **消化器**

投与量設定 **ベバシズマブ 5mg/kg(day1),オキサリプラチン 85mg/m²(day1),レボレチン 200mg/m²(day1),イリリカ 150mg/m²(day1),カルボシチル 2400mg/m²(46hr)(day1-2)**

管理コード **100019**

インターバル日数 **14 (Day1から休業期間を含めたレジメン有効期間)**

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	CVポート メイン	時間: _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート メイン	時間: <u>30分</u>	全量100mLに調製 初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ベバシズマブ BS注 生理食塩液 (希釈用)	5mg/kg 1瓶	○									
3	CVポート メイン	時間: <u>30分</u>			デキサト注射液6.6mg アクリス点滴静注235mg パロセトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1.5瓶 1瓶 1袋	○									
4	CVポート メイン	時間: <u>2時間</u>	全量250mLに調製	●	オキサリプラチン注 ブドウ糖液5% (希釈用)	85mg/m ² 1袋	○									
5	CVポート 側管	時間: <u>2時間</u>	イリリカと同時投与		レボレチン注 大塚糖液5%(250mLソフトパック)	200mg/m ² 1袋	○									
6	CVポート メイン	時間: <u>2時間</u>	レボレチンと同時投与	●	イリリカ注 大塚糖液5%(250mLソフトパック)	150mg/m ² 1袋	○									
7	CVポート メイン	時間: <u>46時間</u>	携帯型デバイス注入器 全量100mLに調製	●	カルボシチル注 生理食塩液 (希釈用)	2400mg/m ² 1瓶	○									