

# 化学療法レジメン

レジメン名 DXR/CPA(AC)

レジメンの概要 乳癌 4～6クール施用

診療科名 乳腺

投与量設定 ドキシルビシン 60mg/m<sup>2</sup>(day1), エントキサン(シクロホスファミド) 600mg/m<sup>2</sup>(day1)

管理コード 150000

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間: <u>30分</u>			デキサート注射液6.6mg	1.5瓶	○								
					アロカス点滴静注235mg	1瓶									
					パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静注	時間: <u>10分</u>	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○								
4	点滴静注	時間: <u>10分</u>	全開で	●	ドキシルビシン注	60mg/m <sup>2</sup>	○								
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
					<b>積算値チェック</b>										
5	点滴静注	時間: <u>10分</u>	全開で	●	エントキサン注	600mg/m <sup>2</sup>	○								
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									