

化学療法レジメン

レジメン名 nal-IRI/LV5FU

レジメンの概要 がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な膵癌

診療科名 消化器 投与量設定 オニバイド(イリリテカン リポソーム製剤) 70,50mg/m<sup>2</sup>(day1),レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup>(day1),5-FU 2400mg/m<sup>2</sup>(46hr)(day1-2)

管理コード 100036 インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	CVポート	時間: _____	埋込式ルート 穿針時利用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート	時間: <u>30分</u>			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○									
					アロカス点滴静注235mg	1瓶										
					パロセトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1袋										
3	CVポート	時間: <u>1時間30分</u>	フィルター不可	●	オニバイド注	70,50mg/m <sup>2</sup>	○	UGT1A1*6若しくはUGT1A1*28のホモ接合体を有する患者、又はUGT1A1*6及びUGT1A1*28のヘテロ接合体を有する患者では、1回50mg/m <sup>2</sup> で開始する。								
					ブドウ糖液5%(500mL)	1袋										
4	CVポート	時間: <u>2時間</u>			レボホリナート注	200mg/m <sup>2</sup>	○									
					ブドウ糖液5%(250mL)	1袋										
5	CVポート	時間: <u>46時間</u>	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	○									
					生理食塩液(希釈用)	1瓶										