

# 化学療法レジメン

レジメン名 CDDP/GEM(消化器)

レジメンの概要 胆道癌

診療科名 消化器

投与量設定 シスプラチン 25mg/m<sup>2</sup>(day1,8),ゲムシタビン 1000mg/m<sup>2</sup>(day1,8)

管理コード 100135

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8							
1	点滴静注 末梢メイン	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>15分</u>			デキサート注射液6.6mg グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1瓶 1袋	○	○							
3	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>1時間30分</u>		●	シスプラチン注 大塚生食注(500mL袋)	25mg/m <sup>2</sup> 1袋	○	○							
					<b>積算値チェック</b>										
4	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>30分</u>		●	ゲムシタビン注 大塚生食注(100mL瓶)	1000mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○	○							
5	点滴静注 末梢側管	時間: <u>1時間30分</u>	ゲムシタビンと同時に 側管より		硫酸Mg補正液1mEq/mL ソラクト輸液(500mL袋)	1管 1袋	○	○							