

化学療法レジメン

レジメン名 FOLFIRINOX

レジメンの概要 治癒切除不能な膵癌

診療科名 消化器

投与量設定 オキサリプラチン 85mg/m²(day1),レボホリナート 200mg/m²(day1),イリノテカン 180mg/m²(day1),5-FU 400mg/m²(bolus)(day1),2400mg/m²(46hr)(day1-2)

管理コード 100016

インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	CVポート メイン	時間: _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	CVポート メイン	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg	1.5瓶	○								
					アロカス点滴静注235mg	1瓶									
					パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋									
3	CVポート メイン	時間: 2時間	全量250mLに調製	●	オキサリプラチン注	85mg/m ²	○								
					ブドウ糖液5% (希釈用)	1袋									
4	CVポート 側管	時間: 2時間	イリノテカンと同時投与		レボホリナート注	200mg/m ²	○								
					大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	1袋									
5	CVポート メイン	時間: 2時間	レボホリナートと同時投与	●	イリノテカン注	180mg/m ²	○								
					大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	1袋									
6	CVポート メイン	時間: 10分	全開で	●	5-FU注	400mg/m ²	○								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
7	CVポート メイン	時間: 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	5-FU注	2400mg/m ²	○								
					生理食塩液 (希釈用)	1瓶									