

# 化学療法レジメン

レジメン名 FOLFIRINOX

レジメンの概要 治癒切除不能な膵癌

診療科名 消化器

投与量設定 林シラフチン 85mg/m<sup>2</sup>(day1), レボシタート 200mg/m<sup>2</sup>(day1), イリリカチン 180mg/m<sup>2</sup>(day1), フルオウラシル 400mg/m<sup>2</sup>(bolus)(day1), 2400mg/m<sup>2</sup>(46hr)(day1-2)

管理コード 100016

インターバル日数 14 (Day1から休業期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	CVポート メイン	時間: _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート メイン	時間: 30分			デキサト注射液6.6mg アカリ点静注235mg パロヒト点静注パック0.75mg 50mL	1.5瓶 1瓶 1袋	○									
3	CVポート メイン	時間: 2時間	全量250mLに調製	●	林シラフチン注 ブドウ糖液5% (希釈用)	85mg/m <sup>2</sup> 1袋	○									
4	CVポート 側管	時間: 2時間	イリリカチンと同時投与		レボシタート注 大塚糖液5%(250mLシラパック)	200mg/m <sup>2</sup> 1袋	○									
5	CVポート メイン	時間: 2時間	レボシタートと同時投与	●	イリリカチン注 大塚糖液5%(250mLシラパック)	180mg/m <sup>2</sup> 1袋	○									
6	CVポート メイン	時間: 10分	全開で	●	フルオウラシル注 生理食塩液PL「フー」 50mL	400mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○									
7	CVポート メイン	時間: 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル注 生理食塩液 (希釈用)	2400mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○									