

化学療法レジメン

レジメン名 PTX/トラスツズマブ(3週・初回8mg/kg)

レジメンの概要 乳癌 導入時用

診療科名 乳腺

投与量設定 パクリタキセル 80mg/m²(day1,8,15),トラスツズマブ 8mg/kg(day1)

管理コード 150046

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day8	Day15						
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○	○	○						
					ファモチジン注射用20mg	1管									
					ホアラミン注5mg	2管									
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶									
3	点滴静注	時間: 1時間	フィルターライン使用	●	パクリタキセル注	80mg/m ²	○	○	○						
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
4	点滴静注	時間: 1時間30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブBS注	8mg/kg	○								
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									