

化学療法レジメン

レジメン名 CDDP/5-FU(FP)

レジメンの概要 食道癌、胃癌、頭頸部癌、原発不明癌

診療科名 消化器

投与量設定 シス<sup>®</sup>ラチン 80mg/m<sup>2</sup>(day1),フルオウラシル 800mg/m<sup>2</sup>(day1-5)

管理コード 100095

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5						
1	点滴静注 末梢メイン	時間 : 1時間30分			硫酸Mg補正液1mEq/mL	1管	○										
					大塚生食注(500mL袋)	1袋	6:00										
2	点滴静注 末梢メイン	時間 : 1時間			大塚生食注(250mL袋)	1袋	○										
							7:30										
3	点滴静注 末梢メイン	時間 : 30分			デキサト注射液6.6mg	1.5瓶	○										
					アホリス点滴静注235mg	1瓶											8:30
					パロセトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1袋											
4	点滴静注 末梢メイン	時間 : 30分			デキサト注射液6.6mg	1瓶		○	○	○	○						
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶											10:00
5	点滴静注 末梢メイン	時間 : 2時間			マニトールS注射液300mL	1袋	○										
							9:00										
6	点滴静注 末梢メイン	時間 : 2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シス <sup>®</sup> ラチン注	80mg/m <sup>2</sup>	○	11:00	<b>積算値チェック</b>								
					生理食塩液 (希釈用)	1袋											
7	点滴静注 末梢メイン	時間 : 24時間		●	フルオウラシル注	800mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	○	○						
					大塚生食注 1L	1袋											13:00
8	点滴静注 末梢側管	時間 : 3時間			リネキゲン注 500mL	1袋	○	○	○	○	○						
							13:00	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30					
9	点滴静注 末梢側管	時間 : 3時間			フィネチン140輸液 500ml	1袋	○	○	○	○	○						
							16:00	13:30	13:30	13:30	13:30						
10	点滴静注 末梢側管	時間 : 3時間			リネキゲン3A輸液(500mL)	1袋	○	○	○	○	○						
							19:00	16:30	16:30	16:30	16:30						