

# 化学療法レジメン

レジメン名 CDDP/5-FU(FP)

レジメンの概要 食道癌、胃癌、頭頸部癌、原発不明癌

診療科名 消化器

投与量設定 シスプラチン 80mg/m<sup>2</sup>(day1),5-FU 800mg/m<sup>2</sup>(day1-5)

管理コード 100095

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5				
1	点滴静注 末梢メイン	時間: 1時間30分			硫酸Mg補正液1mEq/mL	1管	○ 6:00								
					大塚生食注(500mL袋)	1袋									
2	点滴静注 末梢メイン	時間: 1時間			大塚生食注(250mL袋)	1袋	○ 7:30								
3	点滴静注 末梢メイン	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg	1.5瓶	○ 8:30								
					アロカス点滴静注235mg	1瓶									
					パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋									
4	点滴静注 末梢メイン	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg	1瓶		○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00				
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶									
5	点滴静注 末梢メイン	時間: 2時間			マンニトールS注射液300mL	1袋	○ 9:00								
6	点滴静注 末梢メイン	時間: 2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シスプラチン注	80mg/m <sup>2</sup>	○ 11:00	<b>積算値チェック</b>							
					生理食塩液(希釈用)	1袋									
7	点滴静注 末梢メイン	時間: 24時間		●	5-FU注	800mg/m <sup>2</sup>	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00				
					大塚生食注 1L	1袋									
8	点滴静注 末梢側管	時間: 3時間			ソルラゲト輸液(500mL袋)	1袋	○ 13:00	○ 10:30	○ 10:30	○ 10:30	○ 10:30				
9	点滴静注 末梢側管	時間: 3時間			フイジオ140輸液 500ml	1袋	○ 16:00	○ 13:30	○ 13:30	○ 13:30	○ 13:30				
10	点滴静注 末梢側管	時間: 3時間			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋	○ 19:00	○ 16:30	○ 16:30	○ 16:30	○ 16:30				