

化学療法レジメン

レジメン名 トラスツズマブ/XP(2クール目以降6mg/kg)

レジメンの概要 HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌

診療科名 消化器

投与量設定 トラスツズマブ 6mg/kg(day1), シアプ ラチン 60mg/m²(day1) エキソチド(チカフル・キマシル・チラシルK) 80-120mg/day1日2回(day1-14)p.o

管理コード 100090

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間 | 用法・その他 | 癌 | 薬品名称 | 用量/単位 | Day0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | | | | | | | |
|----|---------------|-------------|--|---|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 点滴静注 末梢メイン | 時間 : 1時間30分 | | | 硫酸Mg補正液1mEq/mL | 1管 | | ○ 6:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 大塚生食注(500mL袋) | 1袋 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 点滴静注 末梢メイン | 時間 : 1時間 | | | 大塚生食注(250mL袋) | 1袋 | | ○ 7:30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 末梢メイン | 時間 : 30分 | | | デキサト注射液6.6mg | 1.5瓶 | | ○ 8:30 | | | | | | | | | |
| | | | | | アロカド点滴静注235mg | 1瓶 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | パロチド点滴静注バッグ0.75mg 50mL | 1袋 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 末梢メイン | 時間 : 30分 | | | デキサト注射液6.6mg | 1瓶 | | | ○ 10:00 | ○ 10:00 | | | | | | | |
| | | | | | 生理食塩液PL「77-」 50mL | 1瓶 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 点滴静注 末梢メイン | 時間 : 1時間30分 | 2回目以降も90分投与 注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈 | ● | トラスツズマブ BS注 | 6mg/kg | | ○ 9:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 注射用水(100mL) | 1瓶 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 大塚生食注(250mL袋) | 1袋 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 点滴静注 末梢メイン | 時間 : 2時間 | | | マニトール注射液300mL | 1袋 | | ○ 10:30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 点滴静注 末梢メイン | 時間 : 2時間 | 不要分を抜いて 合計600mLに調製 | ● | シアプ ラチン注 | 60mg/m ² | | ○ 12:30 | | | | | | | | | |
| | | | | | 生理食塩液 (希釈用) | 1袋 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 点滴静注 末梢側管 | 時間 : 2時間 | | | リューゲンF注 500mL | 1袋 | | ○ 14:30 | ○ 10:30 | ○ 10:30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 点滴静注 | 時間 : 4時間 | | | リューゲンF注 500mL | 1袋 | ○ 17:00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 点滴静注 末梢側管 | 時間 : 2時間 | | | フィジオ140輸液 500ml | 1袋 | | ○ 16:30 | ○ 12:30 | ○ 12:30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 点滴静注 末梢側管 | 時間 : 2時間 | | | リルデ Δ3A輸液(500mL) | 1袋 | | ○ 18:30 | ○ 14:30 | ○ 14:30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 点滴静注 末梢メイン | 時間 : | ルートフラッシュ | | 生食液NS 20mL | 1管 | | ○ 20:30 | ○ 16:30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 点滴静注 | 時間 : 4時間 | | | リルデ Δ3A輸液(500mL) | 1袋 | ○ 21:00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 点滴静注 | 時間 : 5時間 | | | 生理食塩液(500mL袋) | 1袋 | | ○ 1:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

積算値チェック