

# 化学療法レジメン

レジメン名 CMF

レジメンの概要 乳癌(1クール4週 6クール施用)

診療科名 乳腺

投与量設定 メトレキサート(メトレキサート) 40mg/m<sup>2</sup>(day1,8),フルオロウラシル 600mg/m<sup>2</sup>(day1,8),エンドキサン(シクロホスファミド) 100mg/m<sup>2</sup>/day(day1-14) p.o

管理コード 150010

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8							
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間: 15分			テキサート注射液6.6mg グラニセロン点滴静注パック1mg/50mL	1瓶 1袋	○	○							
3	点滴静注	時間: 10分	全開で	●	メトレキサート注 大塚生食注(100mL瓶)	40mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○	○							
4	点滴静注	時間: 10分	全開で	●	フルオロウラシル注 大塚生食注(100mL瓶)	600mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○	○							