

# 化学療法レジメン

レジメン名 ラムシルマブ/PTX

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発胃癌

診療科名 消化器

投与量設定 サイラムザ(ラムシルマブ)8mg/kg(day1,15),パクリタキセル 80mg/m<sup>2</sup>(day1,8,15)

管理コード 100145

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○		○						
					ファモチジン注射用20mg	1管									
					ポララミン注5mg	2管									
					グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1袋									
3	点滴静注	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg	1瓶		○							
					ファモチジン注射用20mg	1管									
					ポララミン注5mg	2管									
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶									
4	点滴静注	時間: 30分	全量250mLで調製 フィルターライン使用	●	サイラムザ注	8mg/kg	○		○						
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
			※初回は1時間												
5	点滴静注	時間: _____	ルートフラッシュ		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○		○						
6	点滴静注	時間: 1時間	フィルターライン使用	●	パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>	○	○	○						
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									