

化学療法レジメン

レジメン名 ベバシズマブ/SOX

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌、結腸癌における術後補助化学療法、胃癌

診療科名 消化器

投与量設定 ベバシズマブ 7.5mg/kg(day1),オキサリプラチン 130mg/m²(day1),エスワンタイホウ(テカフル・キメラシル・オテラシルK) 80-120mg/day1日2回(day1-14) p.o

管理コード 100035

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間: 30分	全量100mLに調製 ※初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ベバシズマブBS注 生理食塩液(希釈用)	7.5mg/kg 1袋	○								
3	点滴静注	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1瓶 1袋	○								
4	点滴静注	時間: 2時間	全量500mLに調製	●	オキサリプラチン注 ブドウ糖液5%(希釈用)	130mg/m ² 1袋	○								