

化学療法レジメン

レジメン名 CPT-11/CDDP(消化器:PI)【患者限定】

レジメンの概要 神経内分泌がん

診療科名 消化器

投与量設定 イリノテカン 60mg/m²(day1),シスプラチン 60mg/m²(day1)

管理コード 100500

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注 末梢メイン	時間: 1時間30分			硫酸マグネシウム補正液(20mL)	0.5管	○ 10:00								
					ソルデム3A輸液(500mL)	1袋									
2	点滴静注 末梢メイン	時間: 1時間30分			ソルデム1輸液(500mL)	1袋	○ 11:30								
3	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	Rp.2開始後、側管から		テキサート注射液6.6mg	1.5瓶	○ 11:30								
					アロカス点滴静注235mg	1瓶									
					パロセトン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋									
4	点滴静注 末梢メイン	時間: 10分			テキサート注射液6.6mg	1瓶		○ 10:00	○ 10:00						
					パロセトン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋									
5	点滴静注 末梢メイン	時間: 1時間		●	イリノテカン注	60mg/m ²	○ 13:00	○ 10:10	○ 10:10						
					大塚生食注(250mL)	1袋									
6	点滴静注 末梢メイン	時間: 30分			マンニトールS注射液300mL	1袋	○ 14:00								
7	点滴静注 末梢メイン	時間: 2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シスプラチン注	60mg/m ²	○ 14:30	積算値チェック							
					大塚生食注(希釈用)	1袋									
8	点滴静注 末梢メイン	時間: 2時間			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋	○ 16:30								
9	点滴静注 末梢メイン	時間: 2時間			ソルデム1輸液(500mL)	1袋	○ 18:30								
10	点滴静注 末梢メイン	時間: 10分			大塚生食液PL「フソー」50mL	1瓶		○ 11:10	○ 11:10						