

化学療法レジメン

レジメン名 FEC100

レジメンの概要 乳癌

診療科名 乳腺

投与量設定 エピルビン 100mg/m²(day1), エドキシサン(シクロホスファミド) 500mg/m²(day1), 5-FU 500mg/m²(day1)

管理コード 150006

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間: 30分			テキサート注射液6.6mg	1.5瓶	○								
					アロカス点滴静注235mg	1袋									
					パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶									
3	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○								
4	点滴静注	時間: 10分	※生食50mL抜く 全開で	●	エピルビン注	100mg/m ²	○								
					大塚生食注(100mL瓶)	0.5瓶									
					積算値チェック										
5	点滴静注	時間: 30分		●	エドキシサン注	500mg/m ²	○								
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
6	点滴静注	時間: 30分		●	5-FU注	500mg/m ²	○								
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									