

化学療法レジメン

レジメン名 GEM/トラスツズマブ(初回4mg/kg→2mg/kg)

レジメンの概要 乳癌

診療科名 乳腺

投与量設定 ゲムシタビン 1250mg/m²(day1,8),トラスツズマブ 4mg/kg(day1),2mg/kg(day8,15)

管理コード 150105

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day15						
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	0.5瓶 1瓶	○	○							
3	点滴静注	時間: 30分		●	ゲムシタビン注 大塚生食注(100mL瓶)	1250mg/m ² 1瓶	○	○							
4	点滴静注	時間: 1時間30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブBS注 注射用水(100mL) 大塚生食注(250mL袋)	4mg/kg 1瓶 1袋	○								
5	点滴静注	時間: 30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブBS注 注射用水(100mL) 大塚生食注(250mL袋)	2mg/kg 1瓶 1袋		○	○						