

# 化学療法レジメン

レジメン名 ベバシズマブ/PTX

レジメンの概要 手術不能又は再発乳癌の場合

診療科名 乳腺

投与量設定 ベバシズマブ 10mg/kg(day1,15),パクリタキセル 90mg/m<sup>2</sup>(day1,8,15)

管理コード 150050

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間: 30分	※初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ベバシズマブBS注 大塚生食注(100mL瓶)	10mg/kg 1瓶	○		○						
3	点滴静注	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg ファモチジン注射用20mg ホパラミン注5mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶 1管 2管 1瓶	○	○	○						
4	点滴静注	時間: 1時間	フィルターライン使用	●	パクリタキセル注 大塚生食注(250mL袋)	90mg/m <sup>2</sup> 1袋	○	○	○						