

# 化学療法レジメン

レジメン名 ラムシルマブ/nab-PTX

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

診療科名 消化器

投与量設定 サイラムザ(ラムシルマブ)8mg/kg(day1,15),アブラキサン(パクリタキセル:アルブミン懸濁型)100mg/m<sup>2</sup>(day1,8,15)

管理コード 100146

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注 末梢メイン	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 (day8はフィルター不可)		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注 末梢メイン	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg ボラミン注5mg グラネトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1瓶 2管 1袋	○		○						
3	点滴静注 末梢メイン	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶 1瓶		○							
4	点滴静注 末梢メイン	時間: 30分	全量250mLに調製 フィルターライン使用  ※初回は1時間	●	サイラムザ注 大塚生食注(250mL袋)	8mg/kg 1袋	○		○						
5	点滴静注 末梢メイン	時間: _____	ルートフラッシュ		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○		○						
6	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	調製濃度5mg/mL アブラキサン溶解液のみ 点滴(生食残破棄) 生食の欄:total量を記載 フィルター不可	●	アブラキサン注 大塚生食注(100mL瓶)	100mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○	○	○						