

化学療法レジメン

レジメン名 トラスツズマブ/XP(初回8mg/kg)

レジメンの概要 HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌

診療科名 消化器

投与量設定 トラスツズマブ 8mg/kg(day1), シアプ ラチン 60mg/m²(day1), エド ローダ (加^αシタビ^βン) C法2400-4200mg/day1日2回(day1-14)p.o

管理コード 100085

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day0	Day 1	Day 2	Day 3							
1	点滴静注 末梢メイン	時間 : 1時間30分			硫酸Mg補正液1mEq/mL	1管		○ 6:00									
					大塚生食注(500mL袋)	1袋											
2	点滴静注 末梢メイン	時間 : 1時間			大塚生食注(250mL袋)	1袋		○ 7:30									
3	点滴静注 末梢メイン	時間 : 30分			デキサト注射液6.6mg	1.5瓶		○ 8:30									
					アロカリス点滴静注235mg	1瓶											
					パロヒト点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋											
4	点滴静注 末梢側管	時間 : 30分			デキサト注射液6.6mg	1瓶			○ 10:00	○ 10:00							
					生理食塩液PL「77-」 50mL	1瓶											
5	点滴静注 末梢メイン	時間 : 1時間30分	初回8mg/kg 注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ BS注	8mg/kg		○ 9:00									
					注射用水(100mL)	1瓶											
					大塚生食注(250mL袋)	1袋											
6	点滴静注 末梢メイン	時間 : 2時間			マニトールS注射液300mL	1袋		○ 10:30									
7	点滴静注 末梢メイン	時間 : 2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シアプ ラチン注	60mg/m ²		○ 12:30									
					生理食塩液 (希釈用)	1袋											
8	点滴静注 末梢側管	時間 : 2時間			リユーゲンF注 500mL	1袋		○ 14:30	○ 10:30	○ 10:30							
9	点滴静注	時間 : 4時間			リユーゲンF注 500mL	1袋	○ 17:00										
10	点滴静注 末梢側管	時間 : 2時間			フィジオ140輸液 500ml	1袋		○ 16:30	○ 12:30	○ 12:30							
11	点滴静注 末梢側管	時間 : 2時間			リテ Δ3A輸液(500mL)	1袋		○ 18:30	○ 14:30	○ 14:30							
12	点滴静注 末梢メイン	時間 :	ルートフラッシュ		生食液NS 20mL	1管		○ 20:30	○ 16:30								
13	点滴静注	時間 : 4時間			リテ Δ3A輸液(500mL)	1袋	○ 21:00										
14	点滴静注	時間 : 5時間			生理食塩液(500mL袋)	1袋		○ 1:00									

積算値チェック