

化学療法レジメン

レジメン名 トラスツズマブ(初回8mg/kg)/ペルツズマブ(840mg/body)/DTX

レジメンの概要 乳癌

診療科名 乳腺

投与量設定 トラスツズマブ 8mg/kg(day1),ハーゼタ(ペルツズマブ) 840mg/body(day1),トセタキセル 75mg/m²(day1)

管理コード 150070

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間: <u>1時間30分</u>	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブBS注	8mg/kg	○								
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
3	点滴静注	時間: <u>1時間</u>		●	ハーゼタ注	840mg	○								
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
4	点滴静注	時間: <u>15分</u>			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○								
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶									
5	点滴静注	時間: <u>1時間</u>		●	トセタキセル注	75mg/m ²	○								
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									