

化学療法レジメン

レジメン名 PTX/トラスツズマブ(毎週・初回4mg/kg→2mg/kg)

レジメンの概要 乳癌(1クール4週間分) 導入時用

診療科名 乳腺

投与量設定 パクリタキセル 80mg/m²(day1,8,15,22),トラスツズマブ 4mg/kg(day1) 2mg/kg(day8,15,22)

管理コード 150040

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22				
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○	○				
2	点滴静注	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○	○	○	○				
					ファモチジン注射用20mg	1管								
					ホパラミン注5mg	2管								
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶								
3	点滴静注	時間: 1時間	フィルターライン使用	●	パクリタキセル注	80mg/m ²	○	○	○	○				
					大塚生食注(250mL袋)	1袋								
4	点滴静注	時間: 1時間30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブBS注	4mg/kg	○							
					注射用水(100mL)	1瓶								
					大塚生食注(250mL袋)	1袋								
5	点滴静注	時間: 30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブBS注	2mg/kg		○	○	○				
					注射用水(100mL)	1瓶								
					大塚生食注(250mL袋)	1袋								