

化学療法レジメン

レジメン名 nab-PTX/GEM

レジメンの概要 転移性膵癌

診療科名 消化器

投与量設定 アブラキサン(パクリタキセル:アルブミン懸濁型) 125mg/m²(day1,8,15),ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8,15)

管理コード 100130

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg グラネセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1瓶 1袋	○	○	○						
3	点滴静注	時間: 30分	調製濃度5mg/mL アブラキサン溶解液のみ 点滴(生食残破棄) 生食の欄:total量を記載 フィルター不可	●	アブラキサン注 大塚生食注(100mL瓶)	125mg/m ² 1瓶	○	○	○						
4	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○	○	○						
5	点滴静注	時間: 30分		●	ゲムシタビン注 大塚生食注(100mL瓶)	1000mg/m ² 1瓶	○	○	○						