

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】ペムブロリズマブ+nab-PTX+CBDCA

上限：4クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（扁平上皮癌）

診療科名 呼吸器
管理コード 250202

投与量設定 $\text{キイトルダ}^\circ (\text{ヘム}^\circ \text{リス}^\circ \text{マブ}^\circ) 200\text{mg/body}(\text{day1}), \text{アブラキサン}(\text{パカリスル:フルミシ懸濁型}) 100\text{mg/m}^2(\text{day1,8,15}), \text{カルセプトラチン} \text{AUC}=4\sim6, \text{投与量}=\text{AUC}\times(25+\text{GFR}) (\text{day1})$
インターバル日数 21 （Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注 末梢メイン	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注 末梢メイン	時間： 30分	フィルターライン使用	●	キイトルダ注 生理食塩液PL「フー」 50mL	200mg/body 1瓶	○								
3	点滴静注 末梢メイン	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○								
4	点滴静注 末梢メイン	時間： 30分			デキサート注射液6.6mg アカリ点点滴静注235m g パロセトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	0.5瓶 1瓶 1袋	○								
5	点滴静注 末梢側管	時間： 30分	調製濃度5mg/mL アブラキサン溶解液のみ 点滴(生食残破棄) 生食の欄:total量を記載 フィルター不可	●	アブラキサン注 大塚生食注(100mL瓶)	100mg/m ² 1瓶	○	○	○						
6	点滴静注 末梢メイン	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶	○								
7	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間		●	カルセプトラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトパック)	AUC=4~6 1袋	○								

4クール施行後
【呼】ペムブロリズマブ(250091)へ
移行