

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】ETP+CDDP

上限：6クール

レジメンの概要 小細胞肺癌

診療科名 呼吸器

投与量設定 $\text{イト}^\circ\text{シ}^\circ$ 100mg/m²(day1-3)、 $\text{シス}^\circ\text{ラフ}^\circ$ 80mg/m²(day1)

管理コード 250019

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3						
1	点滴静注 末梢メイン	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間30分			硫酸マグネシウム補正液(20mL)	1管	○								
					リルデ [®] Δ3A輸液(500mL)	1袋	10:00								
3	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間30分			リルデ [®] Δ1輸液(500mL)	1袋	○								
							11:30								
4	点滴静注 末梢側管	時間： 30分	Rp.3開始後、側管から		デ [®] キート注射液6.6mg	1.5瓶	○								
					アロカリス点滴静注235mg	1瓶	11:30								
					パ [®] ロセトン点滴静注パ [®] ック0.75mg 50mL	1袋									
5	点滴静注 末梢メイン	時間： 30分			デ [®] キート注射液6.6mg	1瓶		○	○						
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
6	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間30分		●	イト [®] シ [®] 注【VP-16】	100mg/m ²	○	○	○						
					大塚生食注(500mL袋)	1袋	13:00								
7	点滴静注 末梢メイン	時間： 30分			マンニトールS注射液300mL	1袋	○								
							14:30								
8	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シス [®] ラフ [®] 注	80mg/m ²	○								
					大塚生食注(希釈用)	1袋	15:00	積算値チェック							
9	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間			リルデ [®] Δ3A輸液(500mL)	1袋	○								
							17:00								
10	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間			リルデ [®] Δ1輸液(500mL)	1袋	○								
							19:00								