

化学療法レジメン

レジメン名 DeVIC

上限: 6クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 デキサート(デキサメタゾン) 33mg/body(day1-3),ウロミテキサン(メスナ)300mg/m²×3(day1-3),イホマイド(イフォスファミド) 1500mg/m²(day1-3),エトポシド 100mg/m²(day1-3),カルボプラチン 300mg/m²(day1)

管理コード 200012

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day2	Day3						
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間: 30分			プロイメント点滴静注用150mg 大塚生食注(100mL瓶)	1瓶 1瓶	○ 9:00								
3	点滴静注	時間: 30分			パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋	○ 9:30								
4	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg 大塚生食注(100mL瓶)	5瓶 1瓶	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00						
5	点滴静注	時間: 15分	イホマイド注15分前		ウロミテキサン注 生理食塩液PL「フソー」50mL	300mg/m ² 1瓶	○ 10:30	○ 10:30	○ 10:30						
6	点滴静注	時間: 2時間		●	イホマイド注 大塚生食注(500mL袋)	1500mg/m ² 1袋	○ 10:45	○ 10:45	○ 10:45						
7	点滴静注	時間: 2時間	※体表面積2m ² を超える 場合は50倍希釈する	●	エトポシド注 大塚糖液5%(500mLソフトバッグ)	100mg/m ² 1袋	○ 12:45	○ 12:45	○ 12:45						
8	点滴静注	時間: 15分	イホマイド注開始4時間後		ウロミテキサン注 生理食塩液PL「フソー」50mL	300mg/m ² 1瓶	○ 14:45	○ 14:45	○ 14:45						
9	点滴静注	時間: 1時間		●	カルボプラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	300mg/m ² 1袋	○ 15:00								
10	点滴静注	時間: 15分	イホマイド注開始8時間後		ウロミテキサン注 生理食塩液PL「フソー」50mL	300mg/m ² 1瓶	○ 18:45	○ 18:45	○ 18:45						