

化学療法レジメン

レジメン名 DeVIC

上限:6クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 デキサート(デキサメタゾン) 33mg/body(day1-3),ウロミテキサン(メスナ)300mg/m²×3(day1-3),イホマイド(イフォスファミド) 1500mg/m²(day1-3),エトボシド 100mg/m²(day1-3),カルボプラチン 300mg/m²(day1)

管理コード 200012

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day2	Day3						
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間: 30分			パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋	○								
					アロカス点滴静注235mg	1瓶	9:30								
3	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg	5瓶	○	○	○						
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	10:00	10:00	10:00						
4	点滴静注	時間: 15分	イホマイド注15分前		ウロミテキサン注	300mg/m ²	○	○	○						
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	10:30	10:30	10:30						
5	点滴静注	時間: 2時間		●	イホマイド注	1500mg/m ²	○	○	○						
					大塚生食注(500mL袋)	1袋	10:45	10:45	10:45						
6	点滴静注	時間: 2時間	※体表面積2m ² を超える 場合は50倍希釈する	●	エトボシド注	100mg/m ²	○	○	○						
					大塚糖液5%(500mLソフトバッグ)	1袋	12:45	12:45	12:45						
7	点滴静注	時間: 15分	イホマイド注開始4時間後		ウロミテキサン注	300mg/m ²	○	○	○						
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	14:45	14:45	14:45						
8	点滴静注	時間: 1時間		●	カルボプラチン注	300mg/m ²	○								
					大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	1袋	15:00								
9	点滴静注	時間: 15分	イホマイド注開始8時間後		ウロミテキサン注	300mg/m ²	○	○	○						
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	18:45	18:45	18:45						