

化学療法レジメン

レジメン名 M-VAC

レジメンの概要 進行期膀胱癌・腎盂癌・尿管癌

診療科名 泌尿器 投与量設定 ミノトレキセート(外トレキセート) 30mg/m²(day1,15,22),エクザール(ビンブラスチン) 3mg/m²(day2,15,22),ピノルビン(ヒラルピシン) 30mg/m²(day2),シスプラチン 70mg/m²(day2),アプレビタント 125mg(day1) 80mg(day2,3) p.o

管理コード 300015 インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	...	Day 15	...	Day 22
1	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>右記参照</u>			塩酸トクロプラミド注 10mg ソリュケンF注 500mL	1管 1瓶	○ 9:00 (6時間)	○ 6:00 (4時間)	○ 6:00 (4時間)	○ 6:00 (7時間)	○ 9:00 (6時間)		○ 9:00 (5時間)		○ 9:00 (5時間)
2	点滴静注 末梢側管	時間: <u>30分</u>	★アプレビタント内服(3日間連続 1日目:シスプラチン投与1~1.5時間前 2日目以降:午前中)★		デキサート注射液6.6mg パロセロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1.5瓶 1袋		○ 9:00							
3	点滴静注 末梢側管	時間: <u>30分</u>			デキサート注射液6.6mg 大塚生食注(100mL瓶)	1瓶 1瓶			○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00				
4	側管静注	時間: _____			フロセミド注射液20mg	0.5管		○ 9:30	○ 9:30	○ 9:30					
5	点滴静注 末梢側管	時間: <u>5分</u>	全開で	●	ミノトレキセート注 生理食塩液PL「フソー」50mL	30mg/m ² 1瓶	○ 10:00						○ 10:00		○ 10:00
6	点滴静注 末梢側管	時間: <u>5分</u>	全開で	●	エクザール注 生理食塩液PL「フソー」50mL	3mg/m ² 1瓶		○ 9:35					○ 10:05		○ 10:05
7	点滴静注 末梢側管	時間: <u>5分</u>	全開で	●	ピノルビン注 注射用水(100mLプラスチックボトル)	30mg/m ² 0.5瓶		○ 9:40	積算値チェック						
8	点滴静注 末梢側管	時間: <u>3時間</u>	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シスプラチン注 大塚生食注(500mL袋)	70mg/m ² 1袋		○ 10:00	積算値チェック						
9	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>右記参照</u>			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋		○ 10:00 (6時間)	○ 10:00 (4時間)	○ 13:00 (7時間)	○ 15:00 (6時間)		○ 14:00 (5時間)		○ 14:00 (5時間)
10	側管静注	時間: _____			フロセミド注射液20mg	0.5管		○ 13:00							
11	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>右記参照</u>			塩酸トクロプラミド注 10mg ラクテックC輸液(500mL袋)	1管 1袋		○ 16:00 (4時間)	○ 14:00 (5時間)	○ 20:00 (13時間)					
12	側管静注	時間: _____			フロセミド注射液20mg	0.5管		○ 19:00	○ 19:00						
13	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>右記参照</u>			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋	○ 15:00 (6時間)	○ 20:00 (4時間)	○ 19:00 (5時間)						
14	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>右記参照</u>			ソリュケンF注 500mL	1瓶	○ 21:00 (9時間)	○ 0:00 (6時間)	○ 0:00 (6時間)						