

レジメンの見かた

※患者さんの状態によって、投与量や支持療法薬、投与スケジュール等は変更されることがあります。

化学療法レジメン

レジメン名 SIRB

適応がん種 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

投与量設定 アバスチン(ベマシズマブ) 7.5mg/kg(day1),イリリテカン 150mg/m²(day1),エスワンタイホウ(テガフル・ギメラシル・オテラシルK) 80-120mg/day1日2回(day1-14) p.o

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

抗がん剤の投与量・投与日を表示
内服の抗がん剤や支持療法薬はここに表示
(例) 14日間連日内服ならば(day1-14)p.oと表記

院内で管理
しているコード
を表記

診療科名 消化器

管理コード 100050

(例) 21日毎に繰り返す

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1
1	点滴静脈	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○
2	点滴静脈	時間: 30分	全量100mLに調製 ※初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	アバスチン注 生理食塩液(希釈用)	7.5mg/kg 1瓶	○
3	点滴静脈	時間: 15分			テキサート注射液6.6mg アロキン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1袋	○
4	点滴静脈	時間: 1時間30分		●	イリリテカン注 糖液5%(250mLソフトバッグ)	150mg/m ² 1袋	○
		時間: _____					

1コースのうち何日目に治療があるかを表示
その日に投与する薬剤を○で表記

抗がん剤投与量は以下のように表記
体表面積あたり ... mg/m²
体重あたり ... mg/kg
個体あたり ... mg/body

調製や投与時に必要な
注意点を表示

抗がん剤を●で表記

具体的な治療内容を表示
※患者の状態によって変更される場合あり