

化学療法レジメン

レジメン名 CHOP

上限: 8クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

診療科名 血液 投与量設定 オシロビン(ビンクリスチン) 1.4mg/m²(day1), ドキソルビシン 50mg/m²(day1), エントキシサン(シクロホスファミド) 750mg/m²(day1), プレドニソロン 60mg/m²(day1-5)p.o

管理コード 200000 インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間: 15分			パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋	○								
3	点滴静注	時間: 30分	※最大1回2mg/body	●	オシロビン注 生理食塩液PL「フソー」50mL	1.4mg/m ² 1瓶	○								
4	点滴静注	時間: 30分		●	ドキソルビシン注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m ² 1瓶	○								
				積算値チェック											
5	点滴静注	時間: 2時間		●	エントキシサン注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m ² 1袋	○								