

# 化学療法レジメン

レジメン名 PEM/CBDCA

上限:6クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

診療科名 呼吸器

投与量設定 ペムトレキド 500mg/m<sup>2</sup>(day1),カルボプラチン AUC=4~6,投与量=AUC × (25 + GFR)(day1)

管理コード 250000

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○								
					アロカス点滴静注235mg	1瓶									
					パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静注	時間: 10分	全量100mLに調製	●	ペムトレキド注	500mg/m <sup>2</sup>	○								
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
4	点滴静注	時間: 1時間		●	カルボプラチン注	AUC=4~6	○								
					大塚糖液5%(250mLソフトバック)	1袋									