

化学療法レジメン

レジメン名 ダラツムマブ/Rd(1-2クール目)

レジメンの概要 多発性骨髄腫

診療科名 血液

投与量設定

ダラキューロ(ダラツムマブ, ホルヒアルロンダーゼ[®] アム77) 1瓶(day1,8,15,22), レナデックス(レナリドシト) 25mg/body(day1-21), レナデックス(デキサメタゾン) 40mg(day1,8,15,22)p.o., カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1,8,15,22)p.o., ホララミン(d-グルルフェニラミンマリン酸塩) 2mg(day1,8,15,22)p.o.

管理コード 200037

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22				
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★レナデックス, カロナール, ホララミン内服 (ダラキューロ投与1時間前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○							
2	皮下注射	時間: _____	★レナデックス, カロナール, ホララミン内服 (ダラキューロ投与1時間前までに)★ 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に 本剤15mLを約3～5分かけて投与	●	ダラキューロ注	1瓶	○	○	○	○				

地方独立行政法人 新小山市市民病院