

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】ゲフィチニブ+PEM+CBDCA

上限：6クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

診療科名 呼吸器

投与量設定 $\wedge^\circ$ オレセト[®] 500mg/m²(day1),カサ[®]プ[®]ラチン AUC=3~5,投与量=AUC×(25+GFR) (day1),イレツサ(ゲフィチニブ) 250mg/day(連日)

管理コード 250002

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間： 30分			デキサ [®] 注射液6.6mg	1瓶	○	6クール施行後 【呼】ゲフィチニブ+PEM(250003)へ 移行								
					アカリ [®] 点滴静注235m g	1瓶										
					パ [®] ロ [®] セ [®] ト [®] 点滴静注パ [®] ック0.75mg 50mL	1袋										
3	点滴静注	時間： 10分	全量100mLに調製	●	$\wedge^\circ$ オレセト [®] 注	500mg/m ²	○									
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶										
4	点滴静注	時間： 1時間		●	カサ [®] プ [®] ラチン注	AUC=3~5	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトパ [®] ック)	1袋										