

化学療法レジメン

レジメン名 ゲフィチニブ/PEM/CBDCA

上限:6クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

診療科名 呼吸器

投与量設定 ヘマトレキセト 500mg/m²(day1),カルボプラチン AUC=3~5,投与量=AUC × (25 + GFR)(day1),イレッサ(ゲフィチニブ) 250mg/day(連日)

管理コード 250002

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間: 30分			テキサート注射液6.6mg	1瓶	○	6クール施行後 ゲフィチニブ/PEM(250003)へ移行								
					アロカス点滴静注235mg	1瓶										
					パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋										
3	点滴静注	時間: 10分	全量100mLに調製	●	ヘマトレキセト注	500mg/m ²	○									
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶										
4	点滴静注	時間: 1時間		●	カルボプラチン注	AUC=3~5	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	1袋										