

# 化学療法レジメン

レジメン名 アテゾリズマブ/ベバシズマブ/PTX/CBDCA

上限:6クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

診療科名 呼吸器

投与量設定 テセントリク(アテゾリズマブ) 1200mg/body(day1),ベバシズマブ 15mg/kg(day1),ハククタキセル 175mg/m<sup>2</sup>(day1),カルボプラチン AUC=4~6,投与量=AUC×(25+GFR)(day1)

管理コード 250205

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1										
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○										
2	点滴静注	時間: 30分	フィルターライン使用 ※初回は60分	●	テセントリク注 大塚生食注(250mL袋)	1200mg/body 1袋	○										
3	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○										
4	点滴静注	時間: 30分	※初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ベバシズマブBS注 大塚生食注(100mL瓶)	15mg/kg 1瓶	○										
5	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○										
6	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg ファモチジン注射用20mg ホパラミン注5mg アロカス点滴静注235mg パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1管 2管 1瓶 1袋	○										
7	点滴静注	時間: 3時間	フィルターライン使用	●	ハククタキセル注 大塚生食注(500mL袋)	175mg/m <sup>2</sup> 1袋	○										
8	点滴静注	時間: 1時間		●	カルボプラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	AUC=4~6 1袋	○										

4~6クール施行後  
アテゾリズマブ/ベバシズマブ  
(250206)へ移行