

化学療法レジメン

レジメン名

【呼】ニボルマブ+イピリムマブ+PTX+CBDCA

上限：1クール

レジメンの概要

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

診療科名

呼吸器

投与量設定

ナブパブ（ニボルマブ） 360mg/body(day1,22),イピリムマブ（イピリムマブ） 1mg/kg(day1),パクリタセル 200mg/m²(day1,22),カルボプラチン AUC=4~6,投与量=AUC×(25+GFR) (day1,22)

管理コード

250224

インターバル日数

42（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 22								
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○								
2	点滴静注	時間： 30分	全量60mLに調製 フィルターライン使用	●	ナブパブ注 生理食塩液（希釈用）	360mg/body 1瓶	○	○								
3	点滴静注	時間： 30分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶		○								
5	点滴静注	時間： 30分	全量30mLに調製 フィルターライン使用	●	イピリムマブ注 生理食塩液（希釈用）	1mg/kg 1瓶	○		1クール施行後 【呼】ニボルマブ/イピリムマブ(250225)へ							
6	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
7	点滴静注	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg ファモチジン注射用20mg ホラミン注5mg アカリ点静注235mg パロメトロン点静注パグ 0.75mg 50mL	1瓶 1管 2管 1瓶 1袋	○	○								
8	点滴静注	時間： 3時間	フィルターライン使用	●	パクリタセル注 大塚生食注(500mL袋)	200mg/m ² 1袋	○	○								
9	点滴静注	時間： 1時間		●	カルボプラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトパック)	AUC=4~6 1袋	○	○								