

化学療法レジメン

レジメン名 ニボルマブ/イピリムマブ/PTX/CBDCA

上限:1クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

診療科名 呼吸器

投与量設定 オプジーボ(ニボルマブ) 360mg/body(day1,22),ヤーボイ(イピリムマブ) 1mg/kg(day1),ハクリタキセル 200mg/m²(day1,22),カルボプラチン AUC=4~6,投与量=AUC×(25+GFR)(day1,22)

管理コード 250224

インターバル日数 42 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 22									
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○									
2	点滴静注	時間: 30分	全量60mLに調製 フィルターライン使用	●	オプジーボ注 生理食塩液(希釈用)	360mg/body 1瓶	○	○									
3	点滴静注	時間: 30分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○										
4	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶		○									
5	点滴静注	時間: 30分	全量30mLに調製 フィルターライン使用	●	ヤーボイ注 生理食塩液(希釈用)	1mg/kg 1瓶	○		1クール施行後 ニボルマブ/イピリムマブ(250225)へ移行								
6	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○										
7	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg ファモチジン注射用20mg ポプラミン注5mg アロカス点滴静注235mg パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1管 2管 1瓶 1袋	○	○									
8	点滴静注	時間: 3時間	フィルターライン使用	●	ハクリタキセル注 大塚生食注(500mL袋)	200mg/m ² 1袋	○	○									
9	点滴静注	時間: 1時間		●	カルボプラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	AUC=4~6 1袋	○	○									