

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】nab-PTX+CBDCA

レジメンの概要 非小細胞肺癌、小細胞肺癌【適応外】

診療科名 呼吸器 投与量設定 アブラキサン(パクリタキセル:アルミン懸濁型) 100mg/m²(day1,8,15),加味プロラチン AUC=4~6,投与量=AUC×(25 + GFR) (day1)

管理コード 250017 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○								
					アクリス点滴静注235m g	1瓶									
					パロヒトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静注	時間： 30分	調製濃度5mg/mL アブラキサン溶解液のみ 点滴(生食残破棄) 生食の欄:total量を記載 フィルター不可	●	アブラキサン注	100mg/m ²	○	○	○						
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
4	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶	○								
5	点滴静注	時間： 1時間		●	加味プロラチン注	AUC=4~6	○								
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋									