

# 化学療法レジメン

レジメン名 PEM/CDDP

上限:6クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

診療科名 呼吸器

投与量設定 ヘムレキセド 500mg/m<sup>2</sup>(day1),シスプラチン 75mg/m<sup>2</sup>(day1)

管理コード 250001

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注 末梢メイン	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>2時間</u>			硫酸マグネシウム補正液(20mL) ソルデム3A輸液(500mL)	0.5管 1袋	○ 10:00								
3	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>1時間30分</u>			ソルデム1輸液(500mL)	1袋	○ 12:00								
4	点滴静注 末梢側管	時間: <u>30分</u>	Rp.3開始後、側管から		デキサート注射液6.6mg アロカリス点滴静注235mg パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1.5瓶 1瓶 1袋	○ 12:00								
5	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>10分</u>	全量100mLに調製	●	ヘムレキセド注 大塚生食注(100mL)	500mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○ 13:30								
6	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>30分</u>			マンニトールS注射液300mL	1袋	○ 13:40								
7	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>2時間</u>	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シスプラチン注 大塚生食注(希釈用)	75mg/m <sup>2</sup> 1袋	○ 14:10	積算値チェック							
8	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>2時間</u>			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋	○ 16:10								
9	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>2時間</u>			ソルデム1輸液(500mL)	1袋	○ 18:10								