

化学療法レジメン

レジメン名 ベバシズマブ/PEM

レジメンの概要 扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

診療科名 呼吸器

投与量設定 ベバシズマブ 15mg/kg(day1),ペムトレキセド 500mg/m²(day1)

管理コード 250009

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間 | 用法・その他 | 癌 | 薬品名称 | 用量/単位 | Day 1 | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|--------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 点滴静注 | 時間: _____ | ルートkeep用 フラッシュ用 | | 大塚生食注(100mL瓶) | 1瓶 | ○ | | | | | | | | |
| 2 | 点滴静注 | 時間: 30分 | ※初回は1時間30分 2回目は1時間で投与 | ● | ベバシズマブBS注 大塚生食注(100mL瓶) | 15mg/kg 1瓶 | ○ | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 | 時間: 10分 | フラッシュ用 | | 生理食塩液PL「フソー」50mL | 1瓶 | ○ | | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 | 時間: 15分 | | | デキサート注射液6.6mg 生理食塩液PL「フソー」50mL | 1瓶 1袋 | ○ | | | | | | | | |
| 5 | 点滴静注 | 時間: 10分 | 全量100mLに調製 | ● | ペムトレキセド注 大塚生食注(100mL瓶) | 500mg/m ² 1瓶 | ○ | | | | | | | | |