

化学療法レジメン

レジメン名 エロツズマブ/Rd(1-2クール目)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

診療科名 血液

投与量設定

エムプリシティ(エロツズマブ) 10mg/kg(day1,8,15,22),レフラミド(レナリドスト) 25mg(day1~21)p.o.,レナテックス(デキサメタゾン) 28mg(day1,8,15,22)p.o.,カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1,8,15,22)p.o.,ホウライミン(d-カルルフェニルシリン酸塩) 2mg/day(day1,8,15,22)p.o.

管理コード 200057

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22				
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★カロナール,ホウライミン内服 (エムプリシティ投与30分前まで1回)★		生食液NS 100mL	1管	○	○	○	○				
2	点滴静注	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg ファモチジン注射用20mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶 1管 1瓶	○	○	○	○				
3	点滴静注	時間: 45分			生食液NS 100mL	1瓶	○	○	○	○				
4	点滴静注	時間: _____	フィルターライン使用 注射用水で溶解(残破棄) 必要量を抜き取り希釈 ※速度注意(変速) 初回: 30ml/時(30分) →60ml/時(30分) →残り120ml/時 2回目: 180ml/時(30分) →残り240ml/時 3回目以降: 300ml/時	●	エムプリシティ注 注射用水(100mLプラスチックボトル) 大塚生食注(250mL袋)	10mg/kg 1瓶 1袋	○	○	○	○				

調製時注意点シールあり