

# 化学療法レジメン

レジメン名 ニボルマブ/イピリムマブ/PEM/CBDCA

上限: 1クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

診療科名 呼吸器

投与量設定 オプジーボ(ニボルマブ) 360mg/body(day1,22), ヤーボイ(イピリムマブ) 1mg/kg(day1), ヘムレキセト<sup>®</sup> 500mg/m<sup>2</sup>(day1,22), カルボプラチン AUC=4~6, 投与量=AUC × (25+GFR) (day1,22)

管理コード 250223

インターバル日数 42 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 22									
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○									
2	点滴静注	時間: 30分	全量60mLに調製 フィルターライン使用	●	オプジーボ注 生理食塩液(希釈用)	360mg/body 1瓶	○	○	<b>1クール施行後 ニボルマブ/イピリムマブ(250225)へ移行</b>								
3	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○	○									
4	点滴静注	時間: 30分	全量30mLに調製 フィルターライン使用	●	ヤーボイ注 生理食塩液(希釈用)	1mg/kg 1瓶	○										
5	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○										
6	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg アロカス点滴静注235mg パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1瓶 1袋	○	○									
7	点滴静注	時間: 10分	全量100mLに調製	●	ヘムレキセト <sup>®</sup> 注 大塚生食注(100mL瓶)	500mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○	○									
8	点滴静注	時間: 1時間		●	カルボプラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	AUC=4~6 1袋	○	○									