

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】ペムブロリズマブ+PTX+CBDCA

上限：4クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（扁平上皮癌）

診療科名 呼吸器

投与量設定 キイトルダ（ペムブロリズマブ） 200mg/body(day1),パクリタセル 200mg/m²(day1),カルボプラチン AUC=4～6,投与量=AUC×(25+GFR)（day1）

管理コード 250203

インターバル日数 21（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間： 30分	フィルターライン使用	●	キイトルダ 注	200mg/body	○	4クール施行後 【呼】ペムブロリズマブ(250091)へ移行								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶										
3	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間： 30分			デキサート注射液6.6mg	1.5瓶	○									
					ファモチジン注射用20mg	1管										
					ホウラミン注5mg	2管										
					アロカリス点滴静注235mg	1瓶										
					パクリタセル点滴静注パック0.75mg 50mL	1袋										
5	点滴静注	時間： 3時間	フィルターライン使用	●	パクリタセル注	200mg/m ²	○									
					大塚生食注(500mL袋)	1袋										
6	点滴静注	時間： 1時間		●	カルボプラチン注	AUC=4～6	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋										