

化学療法レジメン

レジメン名 リツキシマブ(血液)

レジメンの概要 悪性リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 リツキシマブ 375mg/m²(day1), 加ナル(アセトアミノフェン) 500mg(day1)p.o,ホ°ラミン(d-グルルヒエラミンレイン酸塩) 2mg/day(day1)p.o

管理コード 200010

インターバル日数 7 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) 他レジメンと併用できるよう設定しています。

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間 | 用法・その他 | 癌 | 薬品名称 | 用量/単位 | Day 1 | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|---|---|---------------------------|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 点滴静注 | 時間: _____ | ルートkeep用 フラッシュ用 ★加ナル,ホ°ラミン内服 (リツキシマブ投与30分前までに)★ | | 大塚生食注(100mL瓶) | 1瓶 | ○ | | | | | | | | | |
| 2 | 側管静注 | 時間: _____ | | | リル・コテブ注射用100mg | 1瓶 | ○ | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 | 時間: _____ | 初回:50mL/h開始, 30分毎に50mL/hずつ増量可 2クール目以降:100mL/h開始, 30分毎に100mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用 | ● | リツキシマブ BS注 生理食塩液 (希釈用) | 375mg/m ² mL | ○ | | | | | | | | | |