

化学療法レジメン

レジメン名 リツキシマブ(血液)

レジメンの概要 悪性リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 リツキサン(リツキシマブ) 375mg/m²(day1), カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1)p.o, ホアラミン(d-クロルフェニラミンマレイン酸塩) 2mg/day(day1)p.o

管理コード 200010

インターバル日数 7 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) 他レジメンと併用できるよう設定しています。

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナール,ホアラミン内服 (リツキサン投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	側管静注	時間: _____			ソル・コージェフ注射用100mg	1瓶	○								
3	点滴静注	時間: _____	初回:50mL/h開始, 30分毎に50mL/hずつ増量可 2クール目以降:100mL/h開始, 30分毎に100mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用	●	リツキサン注 生理食塩液(希釈用)	375mg/m ² mL	○								