

# 化学療法レジメン

レジメン名

【呼】アテゾリズマブ+ベバシズマブ+PTX+CBDCA

上限：6クール

レジメンの概要

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

診療科名

呼吸器

投与量設定

テントリカ(アテゾリズマブ) 1200mg/body(day1),ハバシズマブ 15mg/kg(day1),パクリタセル 175mg/m<sup>2</sup>(day1),カルボプラチン AUC=4~6,投与量=AUC×(25+GFR) (day1)

管理コード

250205

インターバル日数

21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間      | 用法・その他                                 | 癌 | 薬品名称                                                                                   | 用量/単位                      | Day 1 |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|-----------|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 点滴静注    | 時間： _____ | ルートkeep用<br>フラッシュ用<br>フィルターライン使用       |   | 大塚生食注(100mL瓶)                                                                          | 1瓶                         | ○     |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 点滴静注    | 時間： 30分   | フィルターライン使用<br>※初回は60分                  | ● | テントリカ注<br>大塚生食注(250mL袋)                                                                | 1200mg/body<br>1袋          | ○     |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 点滴静注    | 時間： 10分   | フラッシュ用                                 |   | 生理食塩液PL「フー」 50mL                                                                       | 1瓶                         | ○     |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 点滴静注    | 時間： 30分   | 全量100mLに調製<br>※初回は1時間30分<br>2回目は1時間で投与 | ● | ハバシズマブBS注<br>生理食塩液（希釈用）                                                                | 15mg/ kg<br>1瓶             | ○     | 4-6クール施行後<br>【呼】アテゾリズマブ+ベバシズマブ(250206)へ移行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | 点滴静注    | 時間： 10分   | フラッシュ用                                 |   | 生理食塩液PL「フー」 50mL                                                                       | 1瓶                         | ○     |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | 点滴静注    | 時間： 30分   |                                        |   | デキサト注射液6.6mg<br>ファモチジン注射用20mg<br>ホラミン注5mg<br>アロカリス点滴静注235mg<br>パロパトロン点滴静注パグ0.75mg 50mL | 1瓶<br>1管<br>2管<br>1瓶<br>1袋 | ○     |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | 点滴静注    | 時間： 3時間   | フィルターライン使用                             | ● | パクリタセル注<br>大塚生食注(500mL袋)                                                               | 175mg/m <sup>2</sup><br>1袋 | ○     |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | 点滴静注    | 時間： 1時間   |                                        | ● | カルボプラチン注<br>大塚糖液5%(250mLリットルパック)                                                       | AUC=4~6<br>1袋              | ○     |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |